

Stades phénologiques

Les stades phénologiques vont de « sortie de feuilles » à « début de boutons floraux séparés » selon les cépages et les différents secteurs du vignoble départemental.

Excoriose

Des symptômes sont visibles dans certaines parcelles. Cette maladie est favorisée par un printemps pluvieux. Elle est liée à l'historique de la parcelle.

Une protection se justifie uniquement en présence régulière de symptômes. Elle consiste à appliquer du soufre mouillable au stade « éclatement du bourgeon », traitement à renouveler au stade « 2-3 feuilles étalées ». La majorité des soufres sont homologués à la dose de 1,25 kg/hl pour cet usage. Référez vous aux mentions portées sur l'étiquette du produit utilisé pour confirmer les conditions d'utilisation.

Erinose

De faibles symptômes sont visibles notamment sur les Muscats à petits grains et les syrah.

Une intervention ne se justifie que sur les parcelles ayant présenté des symptômes abondants l'année dernière. Seul le soufre mouillable est homologué pour cet usage. Les doses d'utilisation sont variables selon les spécialités commerciales. Deux traitements doivent être effectués aux stades « bourgeon dans le coton » et « pointe verte ».

Mildiou

La modélisation indique un risque faible de contamination sortie hiver. Les dernières données de la modélisation restent stables avec un risque faible. Les premiers foyers susceptibles d'être observés vers le 3 mai, seront issues des contaminations des pluies du 23 avril.

A ce jour aucun foyer primaire n'a été découvert, donc aucune protection spécifique n'est justifiée. Les prochains épisodes pluvieux sont à surveiller, car ils vont accroître le risque de contamination avec le développement de la végétation. C'est l'observation des premiers foyers qui définira la stratégie à adopter.

Oïdium

De nombreux symptômes sont visibles sur de nombreuses parcelles, notamment des drapeaux sur carignan et chardonnay. Les conditions climatiques actuelles sont très favorables au développement du champignon.

Sur carignan, la protection doit débuter au stade « 2-3 feuilles étalées ». Sur les autres

VOS CONTACTS



AIVB - Nicolas CONSTANT
06 63 39 25 02
constant.nicolas@wanadoo.fr




CIVAM BIO 66 - Patrick MARCOTE
Tél. 04 68 35 34 12 / Fax. 04 68 34 86 15
pmarcote.civambio.66@wanadoo.fr



CHAMBRE D'AGRICULTURE ROUSSILLON
Anne DE CHANCEL 06 71 57 19 66
a.dechancel@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Julien THIERY 06 71 57 19 65
j.thiery@pyrenees-orientales.chambagri.fr



parcelles sensibles (muscats, chardonnay, cabernet sauvignon, autres cépages présents dans un environnement fortement contaminé l'année dernière), la protection doit débuter au stade « 3-5 feuilles étalées ». Sur les autres parcelles, le premier traitement peut être retardé au stade « 5-6 feuilles étalées ».

La poursuite de la protection devra se faire à cadence de renouvellement de la spécialité commerciale utilisée.

Les prévisions météo annoncent un risque de pluie en fin de semaine. Privilégiez les traitements au soufre mouillable, plus résistant au lessivage que les poudrages.

Le Stifenia est un produit à base de fénugrec, autorisé en agriculture biologique et bénéficiant d'une Autorisation de Mise sur le Marché Provisoire.

Soyez particulièrement vigilants aux conditions d'application de cette spécialité commerciale, notamment en ce qui concerne la période du premier traitement et le rythme de renouvellement. Ce produit n'a pas d'action directe sur l'oïdium mais agit en tant que stimulateur des défenses de la plante : il doit donc être appliqué avant contamination de la parcelle par le champignon. Cette particularité doit être intégrée dans le raisonnement de la stratégie de lutte contre l'oïdium. Il est déconseillé sur les cépages très sensibles à l'oïdium ou lorsque la pression parasitaire est forte.

Eudémis

Le vol est en cours sur les secteurs de la Plaine, Premiers Coteaux, Cru Banyuls, Moyenne Vallée de l'Agly et la haute vallée de l'Agly, Bas Conflent.

Les pontes sont présentes dès que la parcelle a atteint le stade végétatif « grappes séparées » (stade G ou 15).

Aucune ponte n'a encore été observée sur le Cru Banyuls.

Zone de plaine

Sur les parcelles au stade G le 22 avril, date d'observation des premiers dépôts de pontes.

Les insecticides biologiques à base de bacillus thuringiensis sont à positionner du 1er au 3 mai 2010.

Sinon, attendre le bon stade végétatif (stage G), et intervenez 6 jours après l'observation de ce stade.

Moyenne vallée de l'Agly : Calce (Cabanac), Estagel, Latour de France, Tautavel, Montner, Vingrau, Maury (du Mas Amiel au village).

Sur les parcelles au stade G le 26 avril, date d'observation des premiers dépôts de pontes.

Les insecticides biologiques à base de bacillus thuringiensis sont à positionner du 3 au 5 mai 2010.

Sinon, attendre le bon stade végétatif (stage G), et intervenez 6 jours après l'observation de ce stade.

VOS CONTACTS



AIVB - Nicolas CONSTANT
06 63 39 25 02
constant.nicolas@wanadoo.fr




CIVAMBIO 66 - Patrick MARCOTE
Tél. 04 68 35 34 12 / Fax. 04 68 34 86 15
pmarcote.civambio.66@wanadoo.fr



CHAMBRE D'AGRICULTURE PYRÉNÉES-ORIENTALES
Anne DE CHANCEL 06 71 57 19 66
a.dechancel@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Julien THIERY 06 71 57 19 65
j.thierry@pyrenees-orientales.chambagri.fr



Premiers coteaux : Fourques, terrats, trouillas, Caixas, Oms, Llauro, Tordère, Montauriol, Castelnou.

Sur les parcelles au stade G le 27 avril, date d'observation des premiers dépôts de pontes.

Les insecticides biologiques à base de bacillus thuringiensis sont à positionner du 5 au 7 mai 2010.

Sinon, attendre le bon stade végétatif (stage G), et intervenez 6 jours après l'observation de ce stade.

Bas Conflent : Vinça, Rigarda, Rodès, Estoher, Espira de Conflent, Joch, Finestret.

Sur les parcelles au stade G le 30 avril, date d'observation des premiers dépôts de pontes.

Les insecticides biologiques à base de bacillus thuringiensis sont à positionner du 7 au 9 mai 2010.

Sinon, attendre le bon stade végétatif (stage G), et intervenez 6 jours après l'observation de ce stade.

Haute vallée de l'Agly : Planèzes, Rasiguères, Caramany, Cassagnes, St Arnac, Ansignan, Lesquerdes, Lansac, Bélesta

Sur les parcelles au stade G le 28 avril, date d'observation des premiers dépôts de pontes.

Les insecticides biologiques à base de bacillus thuringiensis sont à positionner du 5 au 7 mai 2010.

Sinon, attendre le bon stade végétatif (stage G), et intervenez 6 jours après l'observation de ce stade.

Pour les autres secteurs, attendre un avis ultérieur.

Les produits à base de spinosad (Success 4 et Musdo 4) peuvent également être utilisés. Cependant, leur utilisation est limitée à 2 applications par an et sur un même ravageur. Il est conseillé de les réserver pour les traitements en deuxième et troisième générations.

Pour les parcelles protégées par confusion sexuelle, les diffuseurs de phéromones doivent être positionnés dès le tout début du premier vol.

Une réunion d'information « lutte contre l'eudémis en viticulture biologique » est prévue le lundi 3 mai (cf ci-dessous).

Prochain bulletin le mercredi 5 mai

Ce bulletin a été rédigé par le service technique de l'AIVB à partir des données épidémiologiques contenues dans le Bulletin de Santé du végétal des Pyrénées-Orientales du 26 avril 2010 (mis à jour le 28 avril pour les observations eudémis), rédigé par le service viticulture de la Chambre d'Agriculture du Roussillon.

VOS CONTACTS



AIVB - Nicolas CONSTANT
06 63 39 25 02
constant.nicolas@wanadoo.fr




CIVAMBIO 66 - Patrick MARCOTE
Tél. 04 68 35 34 12 / Fax. 04 68 34 86 15
pmarcote.civambio.66@wanadoo.fr



CHAMBRE D'AGRICULTURE ROUSSILLON
Anne DE CHANCEL 06 71 57 19 66
a.dechancel@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Julien THIERY 06 71 57 19 65
j.thiery@pyrenees-orientales.chambagri.fr



Réunion Lutte contre l'EUDEMIS en viticulture biologique

Lundi 3 mai à 16 h (salle 506) à la chambre d'agriculture de Perpignan

- Rappels de la biologie de l'eudémis (J. Thiery, CA 66)
- Caractéristiques de produits utilisables en AB (N. Constant, AIVB)
- Présentation des résultats d'essai de la CA 66 (J. Thiery, CA 66)
- Témoignage de producteurs
- Question diverses

VOS CONTACTS



AIVB - Nicolas CONSTANT
06 43 39 25 02
constant.aivb@wanadoo.fr



CIVAMBIO 66 - Patrick MARCOTTE
Tél. 04 68 35 34 12 / Fax. 04 68 34 86 15
pmarcotte.civambio.66@wanadoo.fr



CHAMBRE D'AGRICULTURE ROUSSILLON
Anne DE CHANCEL 06 71 57 19 66
a.dechancel@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Julien THIERY 06 71 57 19 65
j.thiery@pyrenees-orientales.chambagri.fr