

FLASH ARBO 2015 N°4

Ces informations ne sont que des préconisations.
L'application des produits phytosanitaires reste sous votre responsabilité.
Veuillez respecter les règles de leur utilisation.

Civambio66 – N° d'agrément Certiphyto : LR00995

CLOQUE SUR PECHERS

Continuer les traitements à base de cuivre jusqu'au stade G en diminuant les doses jusqu'à 50g de cuivre métal par hectolitre.

Les produits utilisables :

Oxyde cuivreux ; oxychlorure de cuivre, hydroxyde de cuivre, sulfate de cuivre ; voir les spécialités commerciales et les utilisations sur le Sud Arbo PFI et BIO 2015.

NB: l'hydroxyde de cuivre semble être le plus efficace en période très humide.

Recommandations

Un pulvérisateur correctement réglé permettra d'atteindre le haut des arbres et l'ajout d'un mouillant (Escapade) améliorera la qualité de l'application.



Cloque sur pêcher

Marie Singer – Référent technique régional Sud & Bio, Fruits et Légumes Biologiques
marie.singer@bio66.com – Port : 06 23 59 35 87

MONILIOSES, CORYNEUM, BACTERIOSE SUR ABRICOTIERS

Continuer les traitements à base de cuivre jusqu'au stade G en diminuant les doses jusqu'à 50g de cuivre métal par hectolitre.

Plusieurs spécialités de cuivre sont homologuées mais uniquement sur Coryneum et bactérioses.

Il est recommandé de tailler et de brûler les rameaux moniliés.

A noter :

Les Suisses réalisent une protection « stop » Monilia en abricotier en utilisant de faibles doses de cuivre (forme hydroxyde, 300 à 400g de Cuivre métal / ha), dès le deuxième traitement ils rajoutent du soufre mouillable (4 kg de soufre / ha). La protection couvre la période de floraison (stade E à stade G), les traitements sont réalisés avant et après une pluie.

PRODUIT HOMOLOGUE CLOQUE DU PECHER ET MONILIOSE ABRICOTIERS

Rappel : le CURATIO (bouillie sulfocalcique) a obtenu une dérogation d'utilisation sur pêchers contre la cloque et sur abricotiers et pêchers contre monilioses.

Les doses autorisées :

- Autorisé avant floraison à raison de 1 traitement à la dose de 39 L/ha
- - Autorisé après floraison à raison de 4 traitements à la dose de 24 L/ha
- - Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles critiques proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 30 jours. **(Infos extraites sur e-phy).**

Les doses conseillées : traiter à demi-dose.

Ce produit peut remplacer quelques applications de cuivre surtout quand celui-ci devient phytotoxique. Ceci permettra aussi de limiter les doses de cuivre à l'hectare.

Pour commander ce produit contacter :

M. Alain QUERRIOUX

Andermatt France

Tél : 06 11 90 48 92

Marie Singer – Référent technique régional Sud & Bio, Fruits et Légumes Biologiques

marie.singer@bio66.com – Port : 06 23 59 35 87



Maison des agriculteurs B • Mas de Saporta • CS 50023 • 34 875 LATTES cedex
Tél. 04 67 06 23 48 • Fax 04 67 06 23 49 • contact@sud-et-bio.com • www.sud-et-bio.com