

TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER Grapholita molesta

27/04/2016

Ces informations ne sont que des préconisations.
L'application des produits phytosanitaires reste sous votre responsabilité.
Veuillez respecter les règles de leur utilisation. Agrément Certiphyto : LR00995

REMARQUES : ces flashs informent uniquement sur les interventions à réaliser exceptionnellement ou rapidement dans les vergers contre un ravageur ou une maladie sur l'espèce concernée.

TORDEUSE ORIENTALE DU PÊCHER

Si des dégâts importants ont été observés lors de la récolte précédente, des applications de larvicides peuvent compléter la lutte par confusion sexuelle.

1. Le bacillus thuringiensis agit sur les jeunes larves. il est donc souhaitable d'installer un piège à phéromone à l'extérieur de la parcelle confusée pour déterminer le début des vols et ainsi appliquer le traitement dès que ceux-ci s'intensifient.

NB : Un autre piège à phéromone à l'intérieur de la parcelle permettra de s'assurer du bon fonctionnement de la confusion sexuelle et dans ce cas les captures doivent être nulles.

2. Un autre produit : le MADEX TWIN (granulovirus) a une homologation sur la tordeuse orientale du pêcher et présente une bonne efficacité; il doit être utilisé à la dose de 0,1 L/HA et appliqué de préférence sur la première génération.

Ses applications alternées avec le Bacillus thuringiensis permettent de limiter le phénomène de résistance.

Larve de Grapholita molesta



Marie SINGER – Référente technique arboriculture bio régional Sud & Bio
marie.singer@bio66.com – Port : 06 23 59 35 87

